

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 28-4-67 642823

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

25 F.

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 79 d'Avril 1967

1967-12

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers - Comme nous l'avions prévu, des taches parfois nombreuses ont été observées sur les feuilles et les jeunes fruits au début de cette semaine. D'autres apparaîtront dans quelques jours.

Pour éviter l'extension de la maladie ou les contaminations encore possibles par les Ascospores, un traitement devrait être appliqué dès réception de cette note.

Araignées rouges (*Panonychus ulmi*) Les éclosions sont importantes dans la plupart des vergers infestés, à l'exception de ceux de la région de Bordeaux.

Dans les vergers les plus fortement envahis, prévoir un traitement acaricide dans les prochains jours. Dans les autres cas, on pourra attendre, sans inconvénient, une dizaine de jours.

En raison de la résistance de *Panonychus ulmi* à l'égard des esters phosphoriques, résistance observée dans la plupart des vergers du Sud-Ouest, nous conseillerions d'abandonner ces produits même pendant plusieurs années, en particulier dans les plantations de pommiers où les échecs contre l'araignée rouge sont les plus fréquents.

INFORMATIONS

Bactériose du Noyer - La jeune végétation des Noyers, spécialement dans les vergers vigoureux risque d'être atteinte par la Bactériose.

Comme l'ont montré les essais effectués en Dordogne depuis plusieurs années, il serait utile de prévoir un traitement, dès à présent, avec un produit cuprique, à la dose de 150 grs de Cuivre par hectolitre; par exemple une bouillie bordelaise à 0,6%.

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Araignées rouges (*Panonychus ulmi*) Les éclosions des oeufs d'hiver sont en cours dans de nombreux vignobles du Bordelais et des Charentes.

Toutefois, du fait de l'irrégularité du débourrement, il est encore trop tôt pour recommander un traitement généralisé des parcelles infestées. Seuls doivent être protégés les vignobles à végétation précoce, présentant au minimum 3 feuilles étalées par pousse et sur lesquelles les premiers dégâts sont visibles sous forme de ponctuations brunes.

Dans les autres cas, il est préférable de n'intervenir qu'après le relèvement de température qui entraînera une poussée importante de la végétation et la fin des éclosions des oeufs d'hiver.

.../...

P234

.../....

Acaries - Il est fréquent de trouver, actuellement, un assez grand nombre d'acariens à mouvements très vifs et de couleur jaune-citron sous les jeunes feuilles. Il s'agit d'espèces ne présentant aucune importance pour la vigne.

Il ne faut pas les confondre avec l'araignée jaune, *Eotetranychus carpini*, qui est encore très rare sous les feuilles des vignobles touchés l'année dernière. Il est donc inutile jusqu'à nouvel avis de traiter contre cet acarien.

INFORMATIONS

Oïdium - Les premiers symptômes de la maladie viennent d'apparaître sur des ceps atteints en 1966.

Pour prévenir les attaques, un premier traitement devrait être appliqué, la semaine prochaine, dans les foyers de l'an dernier et sur les cépages sensibles.

Bordeaux, le 27 avril 1967

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU